



Storöring även i Idre?

Nyare forskning har fastslagit att det i Storån nedanför Sogna, Sörälven nedanför Båthusströmmen och i delar av Grövlan, förekommer en storöringstam. Den kallas storå-österdalälvsöring. Öringarna har varit avskurna från genetisk kontakt med siljansöring sedan Trängseldammen byggdes (1960). För att åtgärda den uteblivna kontakten med siljansöringen, har Särna-Idre FVOF i år satt ut 120 000 yngel av siljansöring i de nämnda strömavsnitten (d.v.s., för att få mer vandrande, storsvuxen öring). Storöringar växer dubbelt så fort som andra öringar (ett kg per år). Det ger snabbt resultat i form av stigande öringar på tre – fyra-kilo (inom 6 – 7 år). Det har fungerat över förväntan i Österdalälven nedanför Särna. Där fångades år 2010 på spö över 20 st öringar med en medelvikt av 3 kg, den största på 7,6 kg.

En viktig förutsättning för ett ökat storöringbestånd är ett starkt utvandringstryck på föryngrings-lokalerna. Det förutsätter att det finns så mycket småöring, att de känner av varandra näringsmässigt. Fiskas småöringarna hela tiden bort, uppstår inte samma konkurrenstryck, utvandringen minskar och därmed blir, i nästa steg, också återvandringen av storöring mindre. De nya fiskebegränsningarna på sträckan Klingforsen – Sogna, behövs alltså för att öka utvandringen av småöring.

Förbättrad tillgång på storöring kommer att märkas i hela vattensystemet. Jämför till exempel med Ammarnäs. En positiv utveckling av fiskbestånden är nödvändig på sikt.

P. S. Styrelsen har emottagit brev från maskfiskare i denna fråga. På hemsidan läggs brevväxlingen ut www.sarnaidrefvo.se/. Storöringrapporter, beställ på adress: Särna-Idre FVOF, box 26, 79090 Särna.